

# دانلود رایگان سوالات استخدامی پرستاری

## ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (نمونه کامل)

۱- تومورهای بدخیم بافت غده ای چه نامیده می شود؟

۱- کندروسارکوما ۲- لیپوسارکوما ۳- آدنوکارسینوما ۴- گلیوما

۲- علت بیشترین صدمات واردہ بر سیستم گوارش پس از شیمی درمانی کدام مورد است؟

۱- رشد سریع سلول های اپی تلیال ۲- مصرف غالب داروها از راه خوراکی ۳- بی اشتهاایی ناشی از پیشرفت بیماری ۴- اختلال آب و الکترولیت ها

۳- بیماری با سابقه ای مصرف جنتاماپسین، پس از چند روز کاهش حجم ادرار، بی قراری و خواب آلودگی در طی ساعت اخیر، لیتر ادرار رقیق دفع کرده است. احتمال بروز کدام عارضه است؟

۱- نارسایی حاد کلیه ۲- سندرم نفروتیک ۳- گلومرولونفریت ۴- تومور مثانه

۴- در ساعت اولیه پس از جراحی نخاعی، کدام شوک بیشتر از بقیه بیمار را تهدید می نماید؟

۱- هموژئیک ناشی از عروق صدمه دیده ۲- هیپوولمیک ناشی از تشکیل استخر خونی ۳- آنافیلاکتیک ناشی از ایجاد حساسیت به داروهای بیهودی ۴- کاردیوژنیک ناشی از تحریک گره دهلیزی بطئی

۵- کدام یک از انواع نخ بخیه، بیشتر از سایرین در بیماران ایجاد حساسیت می نماید؟

۱- ابریشم ۲- نایلون ۳- کاتکوت کرومیک ۴- کاتکوت ساده

۶- اگر بیمار تراکئوستومی می شده، پس از مصرف هر نوبت غذا، احساس خفگی و سرفه نماید، احتمالاً دچار کدام عارضه است؟

۱- استنوز تراشه ۲ اتساع تراشه ۳- کروز جدار تراکئو بروننشیال ۴- فیستول مری و تراشه

۷- بیماری که هنوز در مرحله انکار بوده و قادر به فراگیری شستشوی محل استومی خود نمی باشد، عدم آمادگی او کدام است؟

۱- روحی ۲ جسمی ۳- تجربی ۴- محیطی

۸- کدام یک از کلستومی ها را نباید شستشو داد؟

الحلقه ۲- دوبل ۳- دایم ۴- مرطوب

۹- اتواسکلروزیس عامل چه نوع گری است؟

۱۰- عصبی ۲ انتقالی ۳- در کی ۴- مختلط

۱۱- بیماری که سابقه فشار خون بالا دارد علاوه بر کاتاراکت ممکن است بیماری به کدام قسمت چشم صدمه بزند؟

۱۲- ایریس ۲- رتین ۳- اسکلرا ۴- قرنیه

۱۳- چنانچه بیمار دچار افزایش داخل جمجمه (ICP) باشد، کدام مورد زیر برای وی خطرناک است و علت آن کدام است؟

۱۴- کاهش حجم مایعات بدن به دلیل اختلال مایعات و الکتروولیت ها ۲- مصرف مایعات هیپر و تونیک وریدی به دلیل افزایش مایعات بدن ۳- تمیز نبودن راه عبور هوا و ساکشن غیر صحیح به دلیل کاهش اکسیژن مغز ۴- وضعیت نیمه نشته به دلیل کاهش اکسیژن مغز

۱۵- مصرف هیدروکسید آلمینیوم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه به چه منظور است؟

۱- جذب کلسیم اضافی سرم افزایش فسفر پلاسما ۳ جذب فسفر اضافی پلاسما ۴- کاهش پتابسیم سرم

۱۶- در بیماران مبتلا به صدمات نخاعی که عمل تزریق در آنها انجام نمی گیرد، پرستار مراقب بروز کدام عارضه است؟

۱- هیپرتانسیون ۲- هیپرترمی ۳- تاکی پنه ۴- تاکی کارדי

۱۷- وجود موج L به دنبال موج T حاکی از اختلال در کدام مورد زیر است؟

۱- اشکال در محور قلب ۲- الکتروولیت ها ۳- تغذیه ۴- مسمومیت دارویی

۱۸- سن مناسب برای تزریق در توده عضله سریت (ربع فوقانی و خارجی) کودکان کدام است؟

۱- ۱ سالگی ۲- ۵ سالگی / ۳- ۶ ماه پس از راه افتادن ۴- ۱ سال پس از راه افتادن

۱۹- مدت زمان طبیعی آپنه ها در دوران نوزادی کدام است؟

۱- کمتر از ۱۵ ثانیه ۲- تا ۳۰ ثانیه ۳- تا ۴۵ ثانیه ۴- حداقل ۱ دقیقه

۱۷- سه علامت اصلی تشخیص انسداد روده در کودک کدام است؟

۱- عدم دفع مدفعه، تب، بی حالی ۲- نفخ شکم، استفراغ، عدم دفع مدفعه ۳- تهوع، عدم دفع مدفعه، ضعف افزایش نبض، رنگ پریدگی، نفخ شکم

۱۸- برای ایجاد آرامش در شیرخوار مبتلا به برونشیولیت، کدام وضعیت مناسب است؟

۱- با بالاتر از سر ۲- خوابیده به پش ۳- خوابیده به پهلو ۴- سر بالاتر از بدن

۱۹- شایع ترین نشانه بیماری در شیرخواران و کودکان کدام است؟

۱ اسهال ۲- استفراغ ۳- تب ۴- بی قراری

۲۰- عقب ماندگی ذهنی در کدام مورد قابل پیشگیری است؟

۱- گالاکتوزومی ۲- هیپوتیروئیدیسم ۳- سندروم داون ۴- فلچ مغزی

۲۱- عارضه بیماری آبله مرغان (واریس) کدام است؟

۱- اس میوکاردیت ۲- گاستروآنتریت ۳- زرد زخم ۴- اوتیت میانی

۲۲- از اصول مهم پانسمان سوختگی کدام است؟

اقرار ندادن دو سطح پوست رو هم ایجاد محدودیت حرکتی در کودک ۳ استفاده از باندهای ساده استفاده از روش ساده دور به نزدیک

۲۳- نشانه های اصلی در تشخیص تب روماتیسمی حاد کدام است؟

۱- تب و کاردیت ۲- خستگی و خونریزی از بینی ۳- پلی آرتریت، لاغری ۴- پلی آرتریت، کاردیت

۲۴- سن آسیب پذیری فرد جهت ابتلا به اختلالات روانی کدام است؟

نوزادی ۲ کودکی ۳- نوجوانی ۴- جوانی

۲۵- سریع ترین واکنش روانی نسبت به تنیدگی کدام است؟

اضطراب ۲- افسردگی ۳- بی خوابی ۴- پرخوری

۲۶- در پرستاری از فرد بحران زده اولویت با کدام اقدام است؟

۱-بستری نمودن ۲-درمان دارویی ۳-فعال نمودن امنیت و حفاظت

۲۷ - هذیان (Delusion) کدام است؟

۱-پرش افکار ۲-اعتقاد غلط و ناپایدار ۳-باورهای درست و پایدار ۴-اعتقاد غلط و پایدار

۲۸-شایع ترین توهם در اسکیزوفرنیا کدام است؟

بینایی ۲-شنوایی ۳ پویایی ۴ چشایی

۲۹-شایع ترین عارضه در درمان با شوک الکتریکی (ECT) کدام مورد است؟

۱-مرگ ناگهانی ۲-فلج عمومی فراموشی ۴-بیهوشی

۳۰-آمفتابمین جزو کدام دسته از داروها است؟

محرك ها ۲-مخدرها ۳-تهیه زاهها ۴-آرام بخش ها

۳۱-اختلال سایکوسوماتیک (عوامل روان شناختی موثر بر جسم) کدام است؟

۱-روانی با منشا هیجانی ۲-روانی با منشا جسمی ۳-جسمی بدون منشا روانی ۴-جسمی با منشا روانی

۳۲-در اسکیزوفرنیای نوع کاتانوئیک، اختلال در چه قسمتی است؟

۱-تفکر ۲-روانی حرکت ۳-درک ۴-رفتار

۳۳-کدامیک یک از مراحل زیر موجب افزایش دانش بهداشتی و دگرگونی رفتارهای بهداشتی می شود؟

آنالیز ۲-تبليغات حساس سازی ۴ انگيزش

۳۴-ایمنی غیر فعال اکستابی در نتیجه ی کدام مورد ایجاد می شود؟

ابتلا به بیماری ها ۲-ترزیق سرم ۳-ترزیق واکسن ها ۴-از طریق جفت

۳۵- محل تزریق واکسن ب.پ.ز کدام است؟

-زیر جلد بازو ۲-درون پوست ساعد . ۳-داخل عضله بازو ۴-داخل جلدی-بازو

۳۶- خصوصیات دموگرافیک یعنی:

۱-متغیر های بهداشتی محیط ۲ متغیرهای مربوط به جمعیت ۳- میزان مهاجرت در جامعه نسبت منابع موجود به جمعیت

۳۷-در سطح روستا عرضه ی خدمات بهداشتی اولیه توسط کدام است؟

-خانه های بهداشت ۲- رابطین بهداشت ۳- تیم سیار ۴- پیام آوران بهداشت

۳۸- موارد منع استفاده از **IUD** کدام است؟

۱- سابقه ی عفونت ادراری آناهنگاری های واژن ۳- بیماری های کبدی ۴- بیماری های دریچه ای قلب

۳۹- به چه منظوری از مانور لئوپولد (LEOPOLD) استفاده می شود؟

تعیین وضعیت جنین ۲- ارزیابی سلامت ۳- چگونگی پیشرفت زایمان ۴- ارزیابی وضعیت سرویکس

۴۰- اصطلاح سومنامبولیسم (**Somnambulism**) به چه معنا است؟

- پر خوابی ۲ محرومیت ۳- راه رفتن در خواب به هم فشردن دندان ها در خواب

۴۱- اختلال شوک اندوتونکسین کدام است؟

۱- اسیدوز تنفسی ۲- آلکالوز تنفسی ۳- آلکالوز متابولیک ۴- اسیدوز متابولیک

۴۲- ضرورت رعایت ایزولاسیون تنفسی در کدام بیماری مطرح است؟

اجذام ۲- گراز ۳- منثیت منگو کو کسی ۴- بوتولیسم

۴۳- دارویی که نمی توان از طریق **TPN** تزریق کرد و باید از طریق ورید محیطی تزریق شود، کدام است؟

۱- کلسیم ۲- انسولین ۳- دیگوکسین ۴- بی کربنات سدیم

۴۴- اولویت مراقبت پرستاری در بیمار میاستنی گراویس کدام است؟

۱- رفع اسپاسم های عضلانی دردناک ۲- پیشگیری از آسپیراسیون ریوی ۳- باز نگه داشتن راه هایی فوقانی ۴  
اهمیت مصرف دارو

۴۵- وضعیت صحیح بیمار بعد از عمل جراحی مغزی زیر چادر ینه. کدام مورد زیر باید باشد؟

انیمه نشسته ۲ خوابیده به پشت ۳- نشسته کامل ۴- خوابیده به پهلو

۴۶- تشویق به استفاده از حمام سرد یا ولرم، در کدام مورد توصیه می شود؟

۱- مولتیپل اسکلروزیس ۲ صرع گراندمال منتریوما ۴- پارکینسون

۴۷- آموزش به بیمار پس از تمپانوپلاستی، کدام مورد است؟

درمان فوری ماستوئیدیت ۲- برداشتن لوزه ها ۳ اجتناب از تخلیه ی بینی با فشار ۴- اجتناب از استحمام

۴۸- بعد از توراستر، نکته مهم مراقبتی کدام است؟

اپوزیشن نشسته انجام فیزیوتراپی رپه ۳- پانسمان فشاری در محل درناز وضعیتی

۴۹- مهم ترین عارضه ساکشن تراشه بیش از ۱۰ ثانیه بدون هیپرونیلاسیون کدام است؟

۱- کنده شدن نسج و خونریزی ۲- دیس ریتمی و ایست قلبی ۳- برونوکواسپاسم ۴- عفونت مجاری هوایی .

۵- بهترین اقدام پرستار در کرامب های داغ عضلانی کدام است؟

۱- دادن مایعات کافی به بیمار ۳ خنک کردن بیمار ۳ خوراندن نمک به بیمار ۴- استراحت

۵۱- اندازه گیری دید محیطی در کدام یک از اختلالات چشمی اهمیت دارد؟

۱- کاتاراكت ۲- گلوکوم ۳ اپرینیس ۴ دکلمان

۵۲- رتین که در کدام یک از دیس ریتمی های ذیل از شوک سینکرونایز استفاده می شود؟

۱- آسیستولی ۲ فلوتر بطئی ۳- فیبریلاسیون بطئی ۴- تاکی کاردی بطئی

۵۳- شایع ترین علت ایجاد عفونت مجار ادراری در هر دو جنس کدام است؟

اسدیابت ملیتوس ۲- نوقف ادرار در مثانه ۳- الودگی مجرای ادراری ۴- معاینات سیستوسکوپی

۵۴- هدف اولیه و فوری در پرستاری از بیماران مبتلا به سنگ کلیه کدام است

برقراری تعادل مایعات ۲- تخفیف درد ۳- برقراری رزژیم غذایی ۴- شکستن سنگ

۵۵- در کدام یک از موارد ذیل می توان بیماری سل را به طور قطعی تشخیص داد؟

۱- تست توبرکولین مثبت ۲- آزمون خلط مثبت ۳- عالیم حاد تنفسی ۴- نقاط کلسیفیه در رادیوگرافی

۵۶- هنگام مصاحبه با کودک و خانواده، وظیفه ی پرستار کدام است؟

۱- گوش دادن به والدین ۲- پاسخ دادن به سوالات آنها ۳- صحبت نمودن متقابل پرستار ۴- عدم استفاده از پاسخ های کلامی

۵۷- هنگام حذف ناگهانی تکیه گاه، نوزاد اندام ها را ابتدا باز و سپس جمع می کند، این حالت کدام رفلکس می باشد؟  
اباینسکی ۲ مورو ۳-تونیک نک . ۴- روتنینگ

۵۸- پس از واکسیناسیون DPT کدام حالت طبیعی می باشد؟

۱- بی حالی ۲- تب خفیف ۳- اسهال ۴- احتقان بینی

۵۹- علامت کرانیوتاس در بررسی جمجمه مربوط به کمبود کدام ویتامین در کودک است؟

۴E- ۴D- ۳D- ۲C- B-1 استرس

۶۰- در صورت مصرف ناکافی کالری در شیر خوار ۸ ماهه کدام شاخص رشدی در مرحله‌ی اول کاهش می یابد؟

۱- قد ۲- وزن ۳- دور سر ۴ دورسینه

۶۱- منفی گرایی در کودکان نوپا نشانه کدام مورد است؟

۱- تربیت نادرست ایجاد حس استقلال . ۳- تحریک زیاد ۴- اضطراب جدایی

۶۲- شایع ترین محل خونریزی داخلی کودکان مبتلا به هموفیلی کدام است؟

مغز ۲ رودها ۳- مفاصل ۴ انتهای استخوانهای دراز

۶۳- در کودک دیابتی چه هنگام نیاز به اضافه کردن انسولین نمی باشد؟

۱- غفونت ۲- ورزش ۳- جراحی

۶۴- مدت سپری شدن بحران معمولا ..... است

۴- ۶- ۱ هفته ۵- ۶- ۲ هفته . ۱۴- ۱۸- ۲- ۳ روز ۴- ۴ هفته

۶۵- Psychosis اختلال در کدام مورد است؟

۱- عملکردی ۲- شخصیتی در آزمون واقعیت ۴- روابط بین فردی

۶۶- تجویز مایعات کافی به فرد سالمند، در پیشگیری و درمان اختلالات کدام دستگاه، کمک بیشتری می کند؟

- ۱- حسی حرکتی ۲- قلب و عروق ۳- تنفس ۴- تولید مثل
- ۶۷- مهم ترین علت اختلالات کنشی جنسی کدام است؟
- ۱- اضطراب ۲- داروها ۳- ارگانیک ۴- ترس
- ۶۸- کدام یک از تشخیص های پرستاری زیر در بحران اولویت دارد؟
- ۱- تغییر در فرآیند تفکر ۲- اختلال در الگوی خواب ۳- توانایی بالقوه جهت آسیب به خود اختلال در روابط اجتماعی
- ۶۹- مهم ترین هدف از مداخلات پرستاری در تبیین کدام است؟
- آموزش بیمار ۲- مصاحبه و مشاهده ۳- تغییر رفتار غیر انطباقی به رفتار انطباقی ۴- از بین بردن عامل تبیین گی
- ۷۰- کدامیک از گزینه های زیر به معنایی اختلال در محتوای فکر است؟
- ۴Obssession- -Delusion -Musion Echolalia
- سمناسب ترین معرف از وضعیت بهداشتی جامعه کدام شاخص است؟
- ۱- ابتلا و میرایی ۲- مرگ و میر کودکان زیر یک سال ۳- مرگ و میر زنان باردار ۴- مرگ و میر کلی جامعه
- ۷۲- کابرد کدام واکسن برای زنان باردار مجاز است؟
- ۱- ویروسی زنده ۲- میکروبی ضعیف شده ۳- توکسوئید میکروب ها ۴- ویروس ضعیف شده
- ۷۳- استفاده از عینک و سمعک جزء کدام سطح پیشگیری است؟
- اطول ۲- دوم ۳- سوم ۴- مقدماتی
- ۷۴- عدم مطالعه توزیع عوامل تعیین کننده بیماری ها در جامعه انسانی چه نام دارد؟
- اکولوژی ۲- مورفولوژی ۳- انتروپولوژی ۴- اپیدمیولوژی
- ۷۵- شاخص های مورد نظر در ارزشیابی بازدید منزل کدامند؟
- ۱- دستیابی خانواده به استقلال مالی ۲- توجه خانواده به وضعیت بهداشتی خود ۳- توجه خانواده به مشکلات رفتاری خود ۴- تغییر رفتار و کاهش میزان بیمار
- ۷۶- کلم مادر اصطلاحا کلمی است که:

۱- به شبکه آب محلی افزوده شود ۲- در خانه توسط مادران تهیه شود ۳- به منبع اصلی آب یا به آب چاه افزوده شود  
۴- توسط مرکز بهداشتی با خانه‌ی بهداشت تهیه شود

۷۷- چه درصدی از کودکان در محدوده‌ی تغییرات طبیعی منحنی رشد قرار می‌گیرند؟

۱-۹۷ ۷۵۲ ۳-۵۰ ۳۰۰۴

۷۸- با تزریق گلوبولین در بدن، کدام ایمنی به وجود می‌آید؟

اکتسابی فعال ۲ اکتسابی غیر فعال ۳-طبیعی فعال ۴ طبیعی غیر فعال

۷۹- با خونریزی قاعده‌ی، کدام قسمت رحم ریزش می‌کند؟

۱- لایه وظیفه‌ای اندومتریوم ۲-مایومتریوم ۳-لایه پایه اندومتریوم ۴-لایه پارامتریوم

۸۰- استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری، موجب توقف کدام مورد می‌شود؟

۱- تقسیمات تخم ۲-تخمک گذاری ۳-لقادح ۴- لانه گزینی تخم

۸۱- تغییرات گوارشی در دوران حاملگی کدام است؟

افزایش تحریک معده و روده‌ها ۲ انقباض عمومی عضلات صاف ۳افزایش فشار داخل مری ۴-تاخیر در تخلیه معده

۸۲- با مشاهده‌ی کدام علامت در نوزاد، مادر باید به پزشک مراجعه کند؟

۱- تغییر رنگ پوست به آبی ۲ استفراغ پنیری شکل ۳- ترشحات خونی از واژن ۴- ترشح شیر از پستان

۸۳- کدام یک از موارد زیر جزء تغییرات بعد از زایمان می‌باشد؟

۱- عدم دفع ادرار ۲- تعریق زیاد ۳- اشتهاهی ۴افزایش فشار خون

۸۴- فایده‌ی ورزش کگل (kegel) کدام است؟

۱- بهبود وضعیت تنفس ۲- کمک به تونیسیته‌ی عضلات شکم ۳- تقویت عضلات پرینه ۴- بهبود گردش خون در پاهای

۸۵- مراقبت پرسنلی بالاصله پس از زایمان کدام است؟

۱- کنترل رحم هر یک ربع ساعت ۲ بررسی پاهای هر ۲ ساعت ۳- کنترل لوشیا هر یک ساعت ۴- بررسی پرینه هر ۶ ساعت

۸۶- اقدام پرستاری قبل از تعویض خون برای نوزاد، کدام است؟

۱- دادن آب قند ۲- قرار دادن به پهلوی چپ ۳- حمام کردن ۴- گرم نگه داشتن

۸۷- عارضه‌ی بی‌حسی اپیدورال با نارکوتیک کدام است؟

۱- افت فشار خون و نبض ۲- خارش پوست صورت ۳- سرد و سرگیجه ۴- تکرار ادرار

۸۸- مصرف کدام یک از داروهای زیر به طور همزمان از یک رنگ، خطناک است؟

ابی کربنات سدیم و کلسیم ۲- بی‌کربنات سدیم و لیدوکائین ۳- آدرنالین و آتروپین ۴- تونسیلات برتیلیوم و آدرنالین

۸۹- مهم‌ترین هدف از توانبخشی بیماران کدام است؟

- آموزش به جامعه برای جلوگیری از ایجاد معلولیت ۲- بالا بردن سطح اقتصاد و وضعیت معیشت جامعه ۳- تسکین آلام جسمی و روانی بیماران ۴- تامین استقلال فردی در انجام فعالیت‌های روزمره

۹۰- پس از انجام آندوسکوپی چه توصیه‌ای بایستی به بیمار نمود؟

فقط مایعات سرد بنوشد ۲ NPO-۳- تا برگشت رفلکس بلع خوردن و آشامیدن پرهیز نماید ۴- بلافاصله پس از اتمام پروسیجر می‌تواند تغذیه را شروع کنی

۹۱- برای جلوگیری از کدام عارضه پس از بیوپسی کبد، بیمار را به پهلو راست قرار می‌دهند؟

| اپریتونیت ۲ ادم ریوی ۳- خونریزی ۴- نشت مواد صفراءوی

۹۲- در موقع آموزش به خانم‌ها جهت معاینه‌ی پستان، توصیه می‌نمایید چه زمانی این کار را انجام دهند؟

۱- شروع سیکل ماهانه ۲- یک هفته پس از شروع سیکل ماهانه ۳- هر ماه در زمان تخمک گذاری ۴- هفته‌ای یک بار به طور مرتب

۹۳- به علت در سوختگی بیش از ۳۰ درصد سطح بدن، کلیه دچار نارسایی خواهد شد؟

افزایش میزان پتابسیم ۲- هیپراورمی ۳- عفونت پسودومونایی ۴- کاهش جریان خون

۹۴- مصرف نیازیدها(دیورتیک) ممکن است چه عارضه‌ای را برای بیمار دیابتیک ایجاد نماید؟

۱- هیپرگلیسمی ۲- هیپوگلیسمی ۳- هیپرکالمی ۴- هیپوناترمی

۹۵- اولین مورد استفاده از آمبوبگ توسط پرستار کدام است؟

۱۴۶- ایست تنفسی ۲ فیبریلاسیون بطنی ۳- کنترل برون ده تنفسی ۴- زخم های جراحی بزرگ با ترشحات فراوان  
پس از جراحی تیروئیدکتومی ساب توtal، پزستار مرتبا از بیمار اسمش را می پرسد. هدف او از انجام این کار،  
بررسی کدام مورد است؟

اصدهمه به عصب لارنژیال ۲ خونریزی داخلی ۳- کاهش سطح هوشیاری انسداد راه هوایی فوقانی

۱۴۷- در ایست قلبی بهترین نبض برای ارزیابی بیمار کدام مورد است؟

۱- رادیال ۲- فمورال ۳- ژیگولار ۴- کاروتید

۱۴۸- مناسب ترین پوزیشن برای بیمار پریکاردیتی جهت کاهش درد و برقراری راحتی کدام است؟

اس خوابیده به پشت ۲- نشسته کمی خم به جلو ۳- خوابیده به پهلو ۴- حالت نیمه نشسته

۱۴۹- در طرح مراقبتی بیمار با فشار داخل جمجمه (ICP) بالا، از کدام مورد اجتناب می شود؟

۱- کاهش تحریکات محیطی ۲- لمس و صحبت با بیمار ۳- چرخش ناگهانی مفاصل ۴- بیدار نکردن بیمار به طور  
ناگهانی

۱۵۰- پیشنهاد شما در مورد مراقبت از بندناف نوزاد کدام است؟

اسپانسман استریل مرتکب با نرمال سالین ۲ استفاده از لوسيون در اطراف بندناف ۳ قرار دادن گاز واژلين استریل روی  
بند ناف ۴- قرار دادن کهنه نوزاد زیر بند ناف

۱۵۱- محل مناسب تزریق عضلانی در کودک ۱/۵ ساله کدام است؟

۱- بخش عمیق عضله دلتوئید ۲- عضله پهلویی ران ۳- ربع فوقانی و خارجی باسن ۴- عضله چهار سر ران

۱۵۲- شرایط مستعد کننده جهت ابتلای کودک به سندروم ری (Rey syndrome) کدام است؟

استفاده از استامینوفن در آنفلونزا ۲- مصرف آسپرین در سیاه سرفه ۳- تجویز استامینوفن در منثیت ۴- مصرف آسپرین  
در آبله مرغان

۱۵۳- در کودک مبتلا به تب روماتیسمی، هدف از استراحت مطلق کدام است؟

۱- پیشگیری از تغییر شکل مفاصل ۲- به حداقل رساندن مصرف آب به حداقل رساندن اثرات فرآیند التهابی ۴-  
تسکین درد مفاصل

۱۰۴- مهم ترین مراقبت پرستاری قبل از عمل جراحی تومور ویلمز کدام است؟

۱-کنترل فشار خون ۲- کمک در انجام آزمایشات ۳-استراحت مطلق ۴- عدم معاینه و لمس شکم

۱۰۵- رژیم غذایی کودک مبتلا به مگاکولون مادرزادی کدام است؟

-پرکالری و دارای فیبر زیاد ۲ دارای باقی مانده کم ۳- پر پروتئین و پرچربی ۴ حاوی ویتامین و فیبر زیاد

۱۰۶- در پیشگیری از عفونت ادراری کودکان، اقدام موثر کدام است؟

۱-تخلیه زود به زود مثانه ۲- خودداری از تماس با افراد آلوده ۳- حمام وان به طور مکرر ۴- مصرف زیاد الکترولیتها

۱۰۷- نوزاد مبتلا به فتق دیافراگماتیک قبل از عمل جراحی، در چه وضعیت قرار داده می شود؟

اسبه سمت ریه میتلا یا نیمه نشسته ۲ در وضعیت Knee chest ۳- به شکم و سر پایین تراز تنه ۴ به سمت ریه سالم یا نیمه نشسته

۱۰۸- تاکید اصلی بهداشت روانی کدام مورد است؟

۱- کم کردن طول مدت بیماری ۲- کاهش شدت عالیم بیماری ۳- محو عالیم بیماری ۴ احترام به شخصیت و حیثیت انسانی

۱۰۹- عکس العمل پرستار در مقابل سکوت بیمار ضمن مصاحبه کدام است؟

۱- تغییر دادن موضوع ۲- سکوت کردن ۳- پرسیدن علت سکوت ۴- پایان دادن به جریان مصاحبه

۱۱۰- احتمال خودکشی در بیمار افسرده چه هنگام بالا می باشد؟

۱- ارتباطی با زمان ندارد ۲- با بیدار شدن در اول روز ۳- بعد از ظهر و غروب ۴- آخر شب هنگام خواب

۱۱۱- بیمار بستری در بخش روانی قادر به شناسایی افراد و آشنایان قبلی خود نمی باشد مشکل وی اختلال در کدام مورد است؟

جهت یابی ۲- عاطفه ۳- درک ۴- تفکر ۱۱۲- موثرترین درمان در معالجه فویبا کدام است؟

۱- خانواده درمانی ۲- روان درمانی ۳- رفتار درمانی ۴- گروه درمانی

۱۱۳- مهم ترین نکته در برقراری ارتباط با بیمار روانی کدام است؟

۱- انجام مشاوره ۲- جلب اعتماد برآوردن نیازهای بیمار ایجاد یک رابطه‌ی صمیمی

۱۱۴- در پرستاری از فردی که دچار بحران شده، کدام اقدام زیر در اولویت قرار دارد؟

۱- بستری نمودن مددجو ۲- استفاده از داروهای آرام بخش امنیت و حفاظت مددجو ۴- شرکت در فعالیت‌های گروهی

۱۱۶- هدف اصلی آموزش بهداشت کدام است؟

- تغییر در نگرش فرد ۲- کاهش هزینه‌ها ۳- دادن آگاهی‌های بهداشتی ۴- تغییر رفتار در مددجو

۱۱۶- ایمنی اکتسابی ایجاد شده توسط واکسیناسیون کدام مورد است؟

افعال طبیعی ۲ فعال مصنوعی ۳- غیر فعال طبیعی ۴- غیر فعال مصنوعی

۱۱۷- در منحنی رشد کودکان، پایین ترین منحنی معرف کدام مورد زیر است؟

اصدق پنجاهم وزن نسبت به قد ۲- صدک نودو هشتم وزن نسبت به سن ۳- صدک سوم وزن نسبت به سن ۴- صدک نودو هفتم وزن نسبت به قد

۱۱۸- استعداد کودکان در کدام خانواده بهتر رشد می‌کند؟

۱- آزادی مطلق ۲- هسته‌ای ۳- دیکتاتوری ۴- دموکراسی

۱۱۹- کاتیونهای عامل سختی آب کدام است؟

اسدیم، پتاسیم ۲- قلوثور، آهن ۳- کلسیم، منیزیم ۴- کلسیم، سدیم

۱۲۰- کدام دسیدوا (Decidua) در تشکیل جفت دخالت دارد؟

کپسولی ۲- قاعده‌ای ۳- جداری ۴- پوشاننده

۱۲۱- بروز کدام مشکل در دوران بارداری غیر طبیعی است؟

۱- تهوع و استفراغ ۲- تکرار ادرار ۳- کمر درد ۴- تاری دید

۱۲۲- اولین علامت جدا شدن جفت در مرحله‌ی سوم زایمان کدام است؟

۱- خونریزی واژینال ۲- افزایش طول بندناf ۳- سفت و کروی شدن رحم ۴- ظاهر شدن جفت در مدخل واژن

۱۲۳- دلیل زیاد بودن ترشح ادرار در روز اول بعد از زایمان کدام است؟

اس دریافت سرم به مقدار زیاد ۲-شل شدن مثانه ۳-خارج شدن مایع بین سلولی ۴- عفونت ادراری

۱۲۴- برای پیشگیری از پره اکلامپسی، رژیم غذایی مادر باید حاوی کدام مورد باشد؟

اسدیم ۲-کلسیم ۳-فسفر ۴-ید

۱۲۵- عامل مستعد کننده جدا شدن زودرس جفت کدام است؟

| ۱- افزایش فشار خون ۲- عفونت لوله های رحمی ۳- اختلال کروموزومی ۴- وجود جای زخم در رحم

۱۲۶- در پرستاری از بیمار مبتلا به گاستریت حادف کدام یک از موارد زیر اولویت دارد؟

۱- رژیم غذایی ساده ۲- پرهیز از مصرف غذای چرب ۳- گذاردن لوله معده جهت کم کردن فشار ۴ ناشتا تا رفع تهوع و استفراغ

**واحد کتابخانه بیمارستان کودکان امیرکلا**

**۱۴۰۲ آبان**